NOTICE EXPLICATIVE DESTINEE AUX PATIENTS

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 Dénomination

Furacine Soluble Dressing
Furacine Solution

1.2 Composition

Furacine Soluble Dressing:
Principe actif: Nitrofural 0,2%. Produits de charge: Macrogol 300, 1000, 3000.
Furacine Solution:
Principe actif: Nitrofural 0,2%. Produits de charge: Macrogol 300, 1500 – Aqua purif.

1.3 Formes pharmaceutiques et conditionnements

Furacine Soluble Dressing est une pommade jaune en tubes de 15 g, 28 g et 30 g ou en poches 375 g (emballage clinique).
Furacine Solution est un liquide jaune transparent en flacons de verre brun de 200 ml, 250 ml et 500 ml (emballage clinique) ou deux flacons de 250 ml (emballage clinique).

1.4 Groupe pharmacothérapeutique

Furacine Solution et Furacine Soluble Dressing (pommade hydrosoluble) sont des agents anti-infectieux cutanés à base de nitrofural, à usage externe.

1.5 Titulaire d'enregistrement et fabricant

Titulaire d'enregistrement:	*Fabricant:*
Limacom nv	Sanico N.V./S.A.,
Kleine Hellekensstraat 53	Industrieterrein 4,
3520 Zonhoven	2300 Turnhout

1.6 Numéro d'enregistrement

Furacine Soluble Dressing - tube: 616 S 323 F 7
Furacine Soluble Dressing - poche: 616 S 838 F 7
Furacine Solution: 616 S 324 F 11

2. INDICATIONS

Furacine Pommade et Furacine Solution sont utilisées:
- pour traiter les infections bactériennes des plaies et des brûlures
- pour éviter les infections bactériennes des plaies et des brûlures
- en cas de transplantations cutanées

Furacine Solution, diluée avec de l'eau stérile, est également utilisée en instillation vésicale.

3. AVANT UTILISATION

3.1 Cas où l'emploi de ce médicament doit être évité

Si vous avez eu une allergie à la Furacine précédemment, vous ne devez plus l'utiliser.

3.2 Précautions particulières

Furacine Solution peut devenir trouble si elle est exposée à des températures basses. Dans ce cas, placez le flacon dans un bain-marie à environ 60 °C jusqu'à ce que la solution redevienne limpide. Conservez ensuite le flacon dans un lieu moins froid.

3.3 Interaction avec d'autres médicaments et des aliments

Pas d'interaction connue avec d'autres médicaments.

3.4 Grossesse et lactation

Utilisez de la Furacine pendant la grossesse et la lactation exclusivement sur conseil de votre médecin.

3.5 Conduite d'un véhicule et utilisation de machines

La Furacine n'exerce aucune influence sur la capacité à conduire un véhicule ou à utiliser des machines.

4. POSOLOGIE ET MODE D'EMPLOI

4.1 Posologie

Plaies et brûlures
Le fait de choisir la pommade ou la solution ne change rien, les deux formes agissent de la même façon.
Comment les utiliser:
- Plaies infectées:
Après nettoyage de la plaie, appliquez Furacine Soluble Dressing directement sur la plaie. Furacine Soluble Dressing peut également être appliquée d'abord sur une compresse de gaze qui sera posée sur la plaie.
Pour appliquer Furacine Solution, utilisez un morceau de gaze. Pour appliquer des compresses, versez d'abord dessus un peu de Furacine Solution dans une petite coupelle propre; ne reversez jamais la solution restante dans le flacon.
- Brûlures:
Dans tous les cas, faites d'abord couler de l'eau froide pendant 15 minutes pour limiter la brûlure. Ensuite, appliquez Furacine Soluble Dressing ou Furacine Solution de la même manière comme indiqué sur les plaies infectées. Les brûlures sévères doivent être traitées à l'hôpital.
Fréquence et durée:
- Pour les plaies infectées, on applique généralement Furacine deux fois par jour. Si aucune amélioration n'est apparue après 5 à 7 jours de traitement, consultez un médecin.
- Pour les brûlures, n'appliquez pas plus d'une fois par jour. Le médecin décidera à quelle fréquence le pansement doit être renouvelé.

Instillation vésicale
Utilisez uniquement Furacine Solution diluée. Suivez scrupuleusement les instructions de votre médecin.

4.2 Mode d'emploi

A usage externe.

4.3 Surdosage

Furacine est à usage externe. L'ingestion de Furacine par la bouche peut entraîner des nausées, des vomissements et des maux de tête. Consultez immédiatement un médecin. Il envisagera éventuellement de faire vomir le patient ou d'effectuer un lavage d'estomac.

5. EFFETS SECONDAIRES

Environ 1 personne sur 100 ne supporte pas bien la Furacine. La peau de la zone où le produit a été appliqué rougit, picote et démange. Si vous constatez ces signes, arrêtez directement l'application de Furacine et prenez contact avec votre médecin.

6. CONSERVATION ET DATE DE PEREMPTION

6.1 Conservation

Conservez Furacine Soluble Dressing et Furacine Solution à température ambiante (15-25°C). Furacine Solution exposée à une température faible peut devenir trouble. La Solution redevient limpide après réchauffement de la bouteille au bain-marie à environ 60°C.

6.2 Péremption

Furacine Soluble Dressing peut être utilisée jusqu'à la date mentionnée sur la boîte, l'étiquette et dans le pli du tube après les lettres EX (premier jour du mois indiqué). Furacine Solution peut être utilisée jusqu'à la date mentionnée sur la boîte et l'étiquette après les lettres EX (premier jour du mois indiqué).

7. DELIVRANCE

Vente libre en pharmacie.

8. DATE DE LA DERNIERE MISE A JOUR DE LA NOTICE EXPLICATIVE

Mars 2008